


# PRISE EN CHARGE BUCCO-DENTAIRE DES PATIENTS SOUS ANTIVITAMINE K (AVK)

Janvier  
2011

Patient sous traitement AVK au long cours  
devant bénéficier d'une intervention de chirurgie buccale



## Les recommandations se limitent aux AVK prescrites au long cours.

Les patients ayant une pathologie cardiovasculaire non stabilisée et/ou possédant d'autres anomalies constitutionnelles ou induites de l'hémostase ainsi que les patients traités par l'association AVK/agents antiplaquettaires et ceux pris en charge en urgence ne sont pas concernés par les recommandations.

\*Haute Autorité de Santé (HAS), *Prise en charge des surdosages en antivitamines K (AVK), des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez des patients traités par AVK, en ville et en milieu hospitalier*, Pr Pierre Sié pour la HAS, avril 2008

## Interactions et contre-indications médicamenteuses

Certaines prescriptions sont contre-indiquées (AINS, acide acétyl-salicylique à forte dose, miconazole) ou déconseillées avec un traitement antivitamine K.

Toute autre prescription doit faire rechercher une éventuelle interaction avec les AVK.

## Modalités de prise en charge en ville (sous réserve de la proximité d'une structure hospitalière)

- Anesthésique **local avec vaso-constricteur**, sauf contre-indication ;
- Usage **systématique** de **matériau hémostatique intra-alvéolaire** ;
- Sutures obligatoires par points séparés ;
- Rinçage passif à l'acide tranexamique (Exacyl®,...) ;
- **Compression** locale post-opératoire > **10 mn** ;
- Contrôle au 3<sup>ème</sup> jour.

## Précautions

- **Assurer la permanence des soins**
- **Prodiguer les conseils d'usage**
- **Remettre un compte rendu d'intervention**

## Principales molécules d'AVK

Dénomination commune	Nom commercial
Fluindione	Préviscan®
Acénocoumarol	Sintrom®, Minisintrom®
Warfarine	Coumadine®

## Évaluation du risque hémorragique en fonction du type d'acte à réaliser

### Actes sans risque hémorragique

- Soins conservateurs
- Soins prothétiques supra-gingivaux
- Anesthésie para-apicale, intraligamentaire ou intraseptale
- Détartrage

### Actes à risque hémorragique modéré

- Avulsions en secteur localisé
- Implant unitaire
- Surfaçage

### Actes à haut risque hémorragique

- Avulsions de plus de trois dents
- Avulsions dans différents quadrants
- Chirurgie parodontale, mucogingivale
- Désinclusion avec traction chirurgico-orthodontique
- Avulsions de dents temporaires
- Avulsions de dents au parodonte amoindri
- Avulsions de dents incluses
- Implants multiples
- Enucléations kystiques et chirurgie apicale
- Biopsie

### Gestes contre-indiqués

- Greffe gingivale libre
- Gestes contre-indiqués selon la conférence de consensus de prévention de l'endocardite infectieuse si ces mesures sont requises
- Tous les gestes présentant un risque hémorragique dans les cas où le plateau technique à la disposition du praticien est insuffisant
- Est déconseillée : anesthésie loco-régionale du nerf alvéolaire inférieur